Brujidera

Vass6R04s041-045



INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

1489Mtp11

4.14 S 14
6 R 4 s 41-45
Brujidéra

4 . 14 S 14

Brujidéra

= Mouriscon. ?







DESIGNATION : Brujidera

CLOS 4 PLANCHE 14 RANG 5 Souche 14

Vigueur : 2,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 1-8-79

Date de Maturité : 5 9 79 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 15

BAIE : TG - G - M - P 19×19

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 7
s2 4 avec pépins - apyrène
s3 2
s4 2 JUS : inc. - coloré
s5

DESIGNATION : Brujidera

CLOS 4 PLANCHE 14 RANG 5 Souche 14

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 13-8-80

Date de Maturité : 22-9-80 +4

Pourriture : 0,5

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 14×17

BAIE : TG - G - M - P 21

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1
s2 8 avec pépins - apyrène
s3 3
s4 2 JUS : inc. - coloré
s5

11

DESIGNATION : Brujidera

CLOS 4 PLANCHE 14 RANG 5 Souche 14

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 1 (coulure)

Date de Véraison : 3-8

Date de Maturité : 8.9.81 +3

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 13 (coulure)

BAIE : TG - G - M - P 20×21

légt. aplat. disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2
s2 3 avec pépins - apyrène
s3 2
s4 2 JUS : inc. - coloré
s5 f

Année : 1977

Emplacement ....4.14.S.14.......... Désignation ...Brujidera...

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		15.3	17.3				
1	2	1 ×	1				
2	3	0	1				
3 f							
4 f							
5 f							

Dle 17.3.77 +11

~~259101~~ /
1489 11

Année : 1978

Emplacement ....4 14 S 14.......... Désignation ...Brujidera...

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		28.3					
1	4	1					
2	4	2.					
3	f						
4	2	2.					
5 f					+17		

Dle 28.3.78

Année : 1979

Emplacement....4.14.5.14...... Désignation..Brujcdera....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		22.3	26.3				
1	4	0	1				
2	4	0	3				
3	4	1	3				
4	4	0	1	Dle	25-3-79 (+9)		
5 g							

Brujidera

Désignation :

Emplacement : 4.14 S14 s.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

jaune

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 76

Brujidèra

Désignation :

Emplacement : 4.14 S 14 1-2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 79

Nº d'ordre : 148911 . . . . Désignation : Bruijidèra . . . .

Origine : . . . . = Mourisco du Douro . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. . . . . . . Vign. . . 4 14 S14 . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3. ♀

9 - L_1/L . . . . 1 - 2 - 3.

10 - L_2/L . . . . 1 - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . 1 - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domergue 82

Brujidéra

Désignation :

Emplacement : 4.14 S14 A.3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. — quelques raies très légèrement colorées

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 77

Brujidéra

Désignation :

Emplacement : 4.14 S14 r-1

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande (3.)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.
(7 à 8)

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5.)

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.
(parfois)

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - Grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 76

Nº d'ordre Brujidéra

Désignation 4.14 S 14

VASSAL Planche Côté Nº Souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 16 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - à long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 19 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7.- arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - un peu juteuse 7 - molle 8.

30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - Abourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

31 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - à long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2. très

Calvo 79

Brujidéra

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : 4.14 S 14 A-2

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne :.........10.... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo77